© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kleinere Mitteilungen.

Ansiedeln von Schnecken. Im Journal of Conchology vol. 10, S. 330 macht Herr Horsley darauf aufmerksam, dass die Versuche, Schnecken an geeigneten Stellen anzusiedeln, gewöhnlich dadurch scheitern, dass man ausgewachsene Exemplare aussetzt, weche ihr Fortpflanzungsgeschäft schon erledigt haben und nun keine Eier mehr legen. Auf Erfolg kann man nur beim Aussetzen halbwüchsiger, noch nicht ganz geschlechtsreifer Exemplare rechnen.

Die prachtvolle und durch ihre überaus zahlreichen Originalexemplare besonders wichtige Möllendorff'sche Sammlung ist durch Kauf in den Besitz der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main übergegangen.

Literatur.

Smith, Herbert H., an annotated Catalogue of Shells of the Genus Partula in the Carnegie Museum. — Reprinted from Annals of the Carnegie Museum vol. 1. 1902 no XVII p. 422—454. Pittsburgh 1903.

Das neugegründete Carnegie Museum in Pittsburgh hat die reiche Sammlung des verstorbenen Prof. Hartmann erworben und damit dessen einzig dastehende Serie von Partula. Smith gibt in der vorliegenden Arbeit eine sorgsame Aufzählung der darin enthaltenen Arten und Exemplare mit zahlreichen kritischen Bemerkungen; beigefügt ist ein Manuskript-Katalog von Garrett und zahlreiche Auszüge aus dessen Korrespondenz.

Hensgen, C., Biometrische Untersuchungen über die Spielarten von Helix nemoralis. — Aus: Biometrica, vol. I no. 4 Aug. 1902.

Der Verfasser hat sehr eingehende Studien über die Verteilung der verschiedenen Bänderkombinationen in der Umgebung von Strassburg, namentlich in einem aufgelassenen, von üppiger

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vegetation überwucherten Festungswerk gemacht, und gibt seine Resultate mit Tabellen und Karten.

Annales de la Société royale Malacologique Belgique 1901 Tome 36.

p. 3. Dautzenberg, Ph., Description de trois Mollusques nouveaux provenant de l'état indépendent du Congo. — Neu: Achatina marteli p. 3 t. 1 fig. 1. 2; — Melania liebrechtsi p. 4 t. 1 fig. 5—8; — Unio buarti p. 6 t. 1 fig. 3—4.

p. 9. Cossmann, M., Appendice No. 3 au Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris. Mit Tafel 2—7 und zahlreichen Abbildungen im Text.

Journal de Conchyliologie. Vol 51, No. 1 (Juni 1903).

p. 5. Dautzenberg, Ph., Contribution à la Faune malacologique terrestre et d'eau douce des îles Obi et Jolo. — Neu: Planispira kurri var. obiensis p. 9; — Papuina pseudolanceolata (= lanceolata unicolor Mlldff.) p. 11; — P. groulti (= rhynchostoma obiana Mlldff.) p. 12; — Leptopoma fulgurans p. 15 t. 1 fig. 10, 11; — L. altius p. 16 t. 2 fig. 12, 13. — Trochomorpha subternatana Dautz. wird als var. zu ternatana, Planispira rollei zu quadrifasciata le Guill. gestellt; — Albersia Waterstraati Rolle zu pubicepa; — omissa Dautz. zu Alb. obiensis; — Papuina pseudosatsuma Mlldff. und obiensis Dautz. zu piliscus Mrts.

p. 21. Vignal, L., sur les varietés du Cerithium zebrum Kiener. (pl. 22).

p. 28. Geret, P., Variété nouvelle de Cypraea provenant de la Nouvelle Caledonie (C. asellus var. bitaeniata).

p. 29. Lavezzari, M., Liste des Coquilles recueillies au Val André. (Cotes-du-Nord). 117 sp. keine neu.

p. 35. Caziot, M. A., sur le genre Bauxia. Die Gattung wird auf drei Arten reduziert.

p. 39. Ancey, C. F., nouvelles remarques sur les faunes australes du globe.

Geänderte Adresse:

Lehrer Carl Schwefel, Küstrin I, Kommandantenstrasse 92.